

Uw pijnbehandeling, stap voor stap uitgelegd.

Amitriptyline

Amitriptyline is de werkzame stof in het geneesmiddel Redomex®. Redomex® is een geneesmiddel dat ingezet wordt in de behandeling van depressieve stoornissen bij volwassenen, maar door hun specifieke werking in ons zenuwstelsel en in onze hersenen kan dit geneesmiddel ook ingezet worden als pijnstiller. In de behandeling van neuropathische pijnen heeft het geen zin om louter met zeer sterke pijnstillers te werken, de zogenaamde opioïden.

De pijnstillende werking van Redomex® berust op het versterken van de pijnremmende banen in ons centraal zenuwstelsel. Hierdoor wordt dit vaak ingezet in de behandeling van neuropathische pijnen, episodes van spanningshoofdpijn of episodes van migraine. Door de gekende sederende werking kan Redomex® ook een gunstig effect hebben op uw slaapkwaliteit.

Doseringen

Wanneer uw behandelend arts u dit geneesmiddel voorschrijft zal hij of zij u een doseringsschema meegeven. Hierop staan de dosissen vermeld die u moet innemen en wanneer.

Redomex® wordt altijd geleidelijk aan opgestart. Dit doen we enerzijds om een zo laag mogelijke dosis te kunnen voorschrijven maar met een maximaal pijnstillend effect.

Anderzijds doen we dit om nevenwerkingen die gepaard gaan met het innemen van dit geneesmiddel zo miniem mogelijk te houden.

Op eigen houtje de doseringen aanpassen is geen goed idee, raadpleeg hiervoor steeds uw behandelende arts. In samenspraak met uw behandelend arts kan ook gekeken worden om de dosis aan te passen indien u te veel last van nevenwerkingen zou ervaren.

Opbouwen van de medicatie

Hieronder ziet u een voorbeeld van een opbouw-schema die uw arts u mogelijks voorschrijft.

- Stap 1: 10mg 2u voor het slapengaan
- Stap 2: 20mg 2u voor het slapengaan
- Stap 3: 30mg 2u voor het slapengaan
- Stap 4: 40mg 2u voor het slapengaan
- Stap 5: 50mg 2u voor het slapengaan

Het pijnstillend effect van Redomex® wordt doorgaans na twee tot vier weken inname waargenomen.

Afbouwen van de medicatie

Bij antidepressiva is het van zeer groot belang om niet plotseling te stoppen met het innemen van uw medicatie! Abrupt stoppen kan ervoor zorgen dat uw klachten verergeren en kan het ontstaan van

ontwenningverschijnselen in de hand werken. Raadpleeg hierover dus steeds uw behandelend arts!

Bijwerkingen

Net zoals elk ander geneesmiddel heeft ook Redomex® een aantal gekende bijwerkingen. Indien u veel last ervaart van de nevenwerkingen van dit geneesmiddel, dan moet u dit zeker melden aan uw behandelend en voorschrijvend arts. Zo kunnen we gepaste maatregelen treffen door bijvoorbeeld de dosis aan te passen, trager op te bouwen of bepaalde andere geneesmiddelen mee op te starten die de klachten zullen verhelpen.

De meest voorkomende bijwerkingen van Redomex® zijn:

- Slaperigheid
- Duizeligheid
- Constipatie
- Misselijkheid
- Droge mond- dorstgevoel
- Gewichtstoename
- Hartkloppingen
- (Sederend effect)

Daarnaast moet zeker ook vermeld worden dat Redomex® een grote invloed heeft op de rijvaardigheid, voornamelijk tijdens de opstartfase van dit geneesmiddel of wanneer de dosis wordt aangepast.



Contactgegevens

Secretariaat pijnkliniek: 09 310 04 56

Spoedgevallen Az Alma: 09 310 17 05

Pijnspecialisten:

- Dr A. Fieuids
- Dr A. Leliaert
- Dr P. Moyaert
- Dr P. Prud'homme

Pijnverpleegkundige

- Tineke Neiryndck 09 310 05 99

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

Atypische
pijnmedicatie
Amitriptyline

